



โรคไข้หัดหมู

สาเหตุ

บริโภคเนื้อหมูที่ติดเชื้อ
ปรังแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ

สัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ
ผ่านทางบาดแผล
รอยขีดข่วนตามร่างกาย
หรือทางเยื่อเมือก

อาการ

ไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ

ประสาทรู้อักเสบ

ถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด
ก็จะเสียชีวิต

การป้องกัน

ไม่กินหมู สุกๆ ดิบๆ

ไม่กินหมูที่ป่วย หรือตายจากโรค

ควรสวมถุงมือขณะปรังเนื้อหมูสด

ล้างมือ ล้างเท้า ล้างตัวให้สะอาด
หลังการสัมผัสหมู



กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกัน



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เตือนระวัง! โรคเมลิออยด์

(โรคไข้ดิน)

แบบมากในฤดูฝน

เป็นโรคติดต่อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ
สามารถพบได้ทั่วประเทศไทย

เกิดจาก

ผู้ป่วยติดเชื้อจากการสัมผัสดินและ
น้ำเป็นเวลานาน หรือบริโภคน้ำ
ไม่สะอาดที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

เข้าสู่ร่างกาย

- ทางผิวหนัง
- การรับประทานอาหาร
- หายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อเข้าไป



กลุ่มเสี่ยง

- ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน
โรคไต โรคธาลัสซีเมีย
และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

- ผู้ที่ประกอบอาชีพ
ที่สัมผัสกับดิน
และน้ำเป็นเวลานาน
เช่น ทำนา

อาการ

มีไข้สูง ไอ และอาจพบแผล
ฝีหนองตามร่างกาย



วิธีป้องกัน

- สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำ
หรือย่ำดิน
- ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก
- ทำความสะอาดร่างกายทันที
หลังมีการสัมผัสน้ำและดิน

หากมีไข้สูง เป็นเวลานานเกิน 3 วัน
หรือเกิดแผลฝีหนองตามร่างกาย
ควรรีบไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

